

LISTADO DE PRODUCTOS



| | PRODUCTO | TERRITORIO | PRODUCTOS DE REFERENCIA | CONCENTRACIÓN Y DOSIS | INDICACIONES |
|---|-----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---|
| Productos Comercializados | FENTANILO TDS | Europa | Durogesic® (Janssen) | 25, 50, 75, 100 mcg/h | Manejo del dolor en pacientes tolerantes a opioides |
| | RIVASTIGMINA TDS * | Latinamérica | Exelon® (Novartis) | 4.6; 9.5 y 13.3 mg/24 horas | Enfermedad de Alzheimer. Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson |
| | DICLOFENAC SÓDICO GEL 1% | Estados Unidos | Voltaren® (GSK) | 1% | Osteoartritis, reumatismo de tejidos blandos, traumatismos |
| | ESTRADIOL GEL | Argentina | Estrogel® (Ascend) | 0.06% | Terapia de reemplazo hormonal |
| | TESTOSTERONA GEL | Argentina | Androgel® (Abbvie) | 1% | Terapia de reemplazo en la deficiencia o ausencia de testosterona endógena |
| | DICLOFENAC SÓDICO GEL 5% | Argentina | Diclac® (Hexal) | 5% | Osteoartritis, reumatismo de tejidos blandos, traumatismos |
| En Etapa de BE | BUPRENORFINA TDS * | Brasil | Butrans® (Purdue Pharma) | 5; 7.5; 10; 15 y 20 mcg/h | Dolor crónico moderado a severo |
| Formulaciones Desarrolladas | ROTIGOTINA TDS | | Neupro® (UCB) | 1; 2; 3; 4; 6 y 8 mg/24h | Enfermedad de Parkinson |
| | SELEGILINE TDS * | Europe (uso compasivo) | Emsam® (Dey L.P./Somerset) | 6; 9 y 12 mg/d | Depresión mayor |
| | METILFENIDATO TDS * | | Daytrana® (Noven) | 10; 15; 20 y 30 mg/9 horas | Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) |
| | TESTOSTERONA GEL | | Androgel® (Abbvie) | 1.62% | Terapia de reemplazo en la deficiencia o ausencia de testosterona endógena |
| Productos en etapa de Desarrollo Farmacéutico | RIVASTIGMINA MULTIDIAS TDS | | Rivalif® (Luye) | 4.6 y 9.5 mg/24 horas | Enfermedad de Alzheimer. Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson |
| | DICLOFENAC TDS | | Zicthoru Tape® (Hisamitsu) | 75 mg | Analgesia en diversos tipos de cáncer y en lumbalgia, periartritis humeroescapular, síndrome cervico-omo-braquial y tenosinovitis |
| | IBUPROFENO TDS | | Neurofen® (Reckitt Benckiser) | 200 mg | Tratamiento sintomático a corto plazo del dolor local en distensión muscular aguda |
| | DONEPECILO MULTIDIAS TDS | | Adlarity® (Corium) / Donerion® (Icure) | 5; 10 mg/24 hours | Enfermedad de Alzheimer. |
| | OPIOIDE CON DISUASOR DE ABUSO TDS | | Producto Innovador | TBC | Manejo del dolor en pacientes tolerantes a opioides |
| | LIDOCAINA TDS | | Lidoderm® (Endo Versatis® (Grünenthal) | 5% | Alivio del dolor asociado a neuralgia post-herpética |

* Menor cantidad de droga y tamaño del parche en comparación con el producto de referencia.